

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

ABONNEMENT ANNUEL :

70,00 F

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone (73) 92-42-68 - Poste 477

Régie de Recettes de la D.D.A.
Sous-Régisseur de Recettes
du Service de la Protection
des Végétaux

Cité Administrative - Rue Pélissier
63034 Clermont Ferrand Cedex
C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

BULLETIN N° 173 du 12 MARS.- (Edition Générale 1981 - N° 4)

CULTURES FRUITIÈRES

ANTHONOME DU POMMIER.

Dans les vergers où des dégâts ont été constatés en 1980, il y a lieu d'intervenir au stade B en utilisant un insecticide à base de LINDANE (20 g de M.A./hl).

CLOQUE DU PECHER

Dans les situations bien exposées, les traitements au cuivre ne peuvent plus être effectués, la végétation est trop avancée (stade B - C).

Par contre, une pulvérisation peut être réalisée avec l'un des produits cités dans le bulletin n° 170 du 23 Février.

Intervenir dès que les bourgeons à bois s'entrouvrent jusqu'au moment où les jeunes feuilles apparaissent.

GRANDES CULTURES

COLZA

. Charançon de la tige

Avec les températures douces que nous connaissons actuellement, le développement du colza est rapide et le stade sensible C2 (décollement du bourgeon terminal, étranglement vert clair à la base du nouveau pétiole, entre-nœuds visibles) est atteint dans les régions les plus précoces.

Les captures pratiquement nulles jusqu'à présent deviennent subitement très importantes, particulièrement dans le PUY-DE-DOME : région de MEZEL, PERIGNAT-les-SARLIEVE, CURNON.

Dans le département de l'ALLIER, les premières captures assez nombreuses, sont notées depuis le 9 Mars dans la région de NAVES.

Dans ces deux départements, il y a lieu d'effectuer un traitement dès les premiers jours de la semaine du 16 au 21 Mars.

Dans la région de LIMOGES (Haute-Vienne), le colza a atteint le stade sensible. Les captures ont débuté depuis le 10 Mars mais elles demeurent faibles. Toutefois, des attaques peuvent se produire tardivement, il est toujours nécessaire de surveiller l'évolution des captures.

Il est rappelé que le seuil d'alerte est de 10 charançons capturés en une journée dans un piège et qu'une intervention doit être déclenchée si on totalise 40 à 50 charançons en une semaine.

(Pour les produits à utiliser, se reporter au tableau ci-contre).

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
PHYTOSANITAIRE,

A. FARGEIX.

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative - Rue Pélissier

63034 CLERMONT-FD CEDEX

Tél. 92.42.68 - Poste 477

JANVIER 1981

R A V A G E U R S D U C O L Z A

MATIERES ACTIVES	SPECIALITES COMMERCIALES	ALTISES ADULTES	ALTISES LARVES	CHARANCON TIGE	MELIGETHES	CHARANCON SILIQUE	PUCERONS
BROMOPHOS	SOVINEXION				X		EX
CYPERMETHRINE	RIPCORD 5	EX					
DECAMETHRINE	DECIS	EX			EX		
DIALIPHOS	TORAK				EX	EX	
ENDOSULFAN	INSECTOPHENE - AGROPHYTE					X	
LINDANE	THIODAN 35 CE			X	EX	X *	
	LINDEX HUILEUX - GAMMACOL			huileux ou col		avant floraison	
	LINDAFOR etc...			EX			
OLEOPARATHION	OLEO BLADAN - PACOL -		EX				
	OLEOTHION - OLEO KRISS etc...						EX *
OXYDEMETON-METHYL	METASYSTEMOX - ANTHONOX						avant floraison
PARATHION-METHYL	PENNCAPM - ECADION-METHYL -	X	EX	EX	EX	X *	
	METHYL BLADAN - METHYL PARA-		huileux	huileux		avant floraison	
	PHENE etc...						
PHOSALONE	AZOFENE - ZOLONE					EX	
PHOSALONE+PARATHION-METHYL	TAXILONE		EX				
PYRIMICARBE	PIRIMOR G						EX
VAMIDOTHION	KILVAL - SEPAPHID						EX *
							avant floraison
CARBOFURAN	CURATER (en localisation)	EX					
THIOFANOX	DACAMOX (en localisation)	EX					

EX : Produits les plus efficaces (Résultats essais 1980 P.V. - CETIOM)

X : Produits ayant une action suffisante

* : Dangereux pour les abeilles